

© זהבית צבי

גאומטרייה אוקלידית - פתרון תרגיל 4

שאלה 1:

הוכיחו את משפט 1.H:

א. אם $P = P'$ אם ורק אם P על מעגל ההפיכה γ .

הוכחה

נוכיח שנקודה על γ עוברת לעצמה.

נקודה P על γ מקימת: $|OP| = r$ כאשר O מרכז המעגל γ ו $r > 0$ רדיוסו.

ולכן עפ"י המשוואה $|OP| \cdot |OP'| = r^2$ נחלץ את $|OP'|$ ונקבל:

$$P = P' \Leftrightarrow |OP'| = |OP| \Leftrightarrow |OP'| = \frac{r^2}{|OP|=r} = r$$

ומקימות שמרחקן מהראשית שווה $[|OP'| = |OP|]$.

ב. אם P בתוך γ אז P' מחוץ ל- γ , ולהיפך, אם P מחוץ ל- γ אז P' בתוך γ .

הוכחה

למעשה אנחנו מוכיחים נוכיח שהעתקה מחליפה את פנים המעגל בחוץ.

כל נקודה P בפנים המעגל מקימת את אי-השוויון הזה: $|OP| < r$.

ולכן עפ"י המשוואה $|OP| \cdot |OP'| = r^2$ וכיוון שאנו יודעים כי $|OP| < r$ אזי בהכרח על מנת שהמכפלה תתן לנו r^2 נבדוק את האורך $|OP'|$. האופציות הן:

$$\text{אם } |OP'| < r \text{ נקבל } \underbrace{|OP|}_{<r} \cdot \underbrace{|OP'|}_{<r} < r^2 \text{ ולכן נפסל.}$$

$$\text{אם } |OP'| = r \text{ נקבל } \underbrace{|OP|}_{<r} \cdot \underbrace{|OP'|}_{=r} < r^2 \text{ ולכן נפסל.}$$

(*) ורק כאשר $|OP'| > r$ נוכל לקבל $|OP| \cdot |OP'| = r^2$, כי רק משהו שקטן מ- r כפול משהו שגדול מ- r יכול לתת לנו r^2 . $|OP'| > r \Leftrightarrow r^2$.

כלומר כל הנקודות בפנים המעגל $|OP| < r$ מועתקות לחוץ המעגל $|OP'| > r$.

אותו דבר ההיפך – כל הנקודות מחוץ למעגל מועתקות לפנים המעגל.

© זהבית צבי

שאלה 2:

הוכיחו את משפט 4.H:

נניח ש- T ו- U נקודות על γ שלא עומדות זו מול זו על קוטר (כלומר TU מיתר שאינו קוטר, אינו עובר דרך O מרכז המעגל γ), ונניח P הקוטב של TU , אז $PT \cong PU$, $\sphericalangle PTU \cong \sphericalangle PUT$, $\overrightarrow{OP} \perp \overrightarrow{TU}$.

המעגל δ עם מרכז P ורדיוס $PT \cong PU$ חותך את γ ומאונך לו בנקודות T ו- U .

הוכחה

נתבונן במשולשים ישרי-זווית ΔOUP ו- ΔOTP :

$\sphericalangle OUP = \sphericalangle OTP = 90^\circ$ - זווית בין משיק לרדיוס בנקודת ההשקה היא ישרה.

$OU \cong OT$ רדיוסים ב- γ (ניצב)

$OP \cong OP$ צלע משותפת (יתר במשולשים ישרי-זווית).

לפי קריטריון יתר-ניצב לחפיפת משולשים ישרי-זווית נקבל $\Delta OUP \cong \Delta OTP$.

מכאן לפי הגדרת משולשים חופפים נקבל בפרט: $PT \cong PU$, $\sphericalangle OPT \cong \sphericalangle OPU$.

כעת נתבונן ב- ΔTPU :

$PT \cong PU$ קיבלנו קודם לפי חפיפה, לכן המשולש שווה-שוקים.

זוויות הבסיס $\sphericalangle PTU \cong \sphericalangle PUT$ במשולש שווה שוקים הן חופפות.

מכיוון ש- $\sphericalangle OPT \cong \sphericalangle OPU$ (קיבלנו בחפיפה הקודמת), \overrightarrow{PO} חוצה זווית $\sphericalangle TPU$.

במשולש שווה שוקים חוצה הזווית הראש, \overrightarrow{PO} , מאונך לבסיס TU , לכן $\overrightarrow{OP} \perp \overrightarrow{TU}$.

נשים לב כיוון שהמשיק למעגל γ מאונך לרדיוס המעגל. משיק זה הינו רדיוס של המעגל δ , אנו מקבלים כי הרדיוסים של שני המעגלים מאונכים זה לזה ולכן לפי הגדרה **המעגלים מאונכים**.