

# משפטים למבחן בחשבון אינפיניטסימלי II

## דביר חדד

☺ תודה רבה לנועה רובין על הסיכומים במהלך השנה ☺

א. **משפט:** פונקציה רציפה בקטע סגור הינה אינטגרבילית

**הוכחה:** נוכיח כי כל פונקציה רציפה בקטע סגור היא אינטגרבילית. לפי המשפט הראשון של וורשטרס  $f(x)$  רציפה ולכן חסומה בקטע  $[a, b]$ . ולכן התנאי הראשון בשביל רימן מתקיים.

יהי  $\varepsilon > 0$ ,  $f(x)$  רציפה במ"ש בקטע  $[a, b]$ . זאת אומרת קיים  $\delta > 0$  כך שלכל  $x, y \in [a, b]$  אם  $|x - y| < \delta$  אזי  $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$ . אנו טוענים כי  $\delta$  זה עובד לתנאי השני של קריטריון רימן.

אכן, תהי חלוקה  $T$  כך ש  $\lambda(T) < \delta$ . הקטע  $[x_{i-1}, x_i]$  הינו סגור והפונקציה רציפה בו.

לכן, לפי וורשטרס השני קיימות נקודות מינימום ומקסימום שמקיימות  $f(y_i) = \inf\{f(x), x \in \Delta x_i\} = m_i$  וגם  $f(z_i) = \sup\{f(x), x \in \Delta x_i\} = M_i$

לכן  $\omega_i = M_i - m_i$ .

אבל שתי הנקודות  $y_i, z_i$  נמצאות באותו תת קטע של  $T$  לכן בהכרח  $|z_i - y_i| \leq \Delta x_i \leq \lambda(T) < \delta$

ולכן  $|f(z_i) - f(y_i)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$  ופרט  $\omega_i < \frac{\varepsilon}{b-a}$ .

לכן  $\varepsilon = \frac{\varepsilon}{b-a} (b-a) = \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \frac{\varepsilon}{b-a} \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i$ . זהו התנאי השני, הוא מתקיים, ולכן  $f(x)$

אינטגרבילית. מ.ש.ל. ■

ב. **משפט:** פונקציה מונוטונית בקטע סגור הינה אינטגרבילית

**הוכחה:** נניח כי הפונקציה שלנו היא עולה, עבור יורדות ההוכחה דומה. בעצם מראים כי קריטריון רימן מתקיים.

הפונקציה מונוטונית, לכן עבור  $x \in [a, b]$  מתקיים  $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$ . בפרט,  $f(x)$  חסומה, והקריטריון הראשון מתקיים.

כעת, יהי  $\varepsilon > 0$ . אם  $f(a) = f(b)$  אז הפונקציה היא קבועה, והוכחנו בעבר כי פונקציה קבועה היא אינטגרבילית. נניח כי

$f(a) < f(b)$  אינה קבועה, ז"א  $f(a) < f(b)$ .

נגדיר  $\delta = \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)} > 0$  ונבדוק אם הוא עובד לתנאי השני של הקריטריון של רימן. תהי חלוקה  $T$  כך ש  $\lambda(T) < \delta$ .

$T: a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$  לכל קטע  $[x_{i-1}, x_i]$  אם  $x \in [x_{i-1}, x_i]$  אזי  $f(x_{i-1}) \leq f(x) \leq f(x_i)$

וגם יוצא כי  $m_i = \inf\{f(x), x \in \Delta x_i\} = f(x_{i-1})$

וגם  $M_i = \sup\{f(x), x \in \Delta x_i\} = f(x_i)$  כי היא מונוטונית עולה.

קיבלנו  $\omega_i = M_i - m_i = f(x_i) - f(x_{i-1})$ .

$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i \stackrel{\Delta x_i \leq \lambda(T) < \delta}{\approx} \sum_{i=1}^n \delta (f(x_i) - f(x_{i-1})) = \delta \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) = \delta (f(b) - f(a)) = \varepsilon$ 
 לכן ז"א, לכל  $\varepsilon > 0$  מצאנו  $\delta > 0$  כך שלכל  $T$  עם  $\lambda(T) < \delta$  מתקיים התנאי השני של רימן  $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$ . ומכאן ש- $f(x)$  אינטגרבילית. מ.ש.ל. ■

**משפט:** פונקציה היא אינטגרבילית בקטע סגור אם ורק אם בכל אפסילון והתחתון הינו פחות מאפסילון. סכומי דרבו העליון והתחתון הינו פחות מאפסילון.

תהי  $f(x)$  פונקציה שמוגדרת בקטע  $[a, b]$  ואינטגרבילית בקטע זה או"א היא מקיימת את שני התנאים הבאים:

1.  $f(x)$  חסומה בקטע  $[a, b]$ .

2. לכל  $\varepsilon > 0$  קיים  $\delta > 0$  כך שלכל חלוקה  $T$  שמקיימת  $\lambda(T) < \delta$  מתקיים  $\varepsilon > \bar{S}(T) - \underline{S}(T) = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i$ .

**הוכחה:**

$\Leftarrow$ : נניח כי  $f(x)$  אינטגרבילית. לפי משפט, היא חסומה. ולכן התנאי הראשון מתקיים. בגלל שהפונקציה אינטגרבילית

$$\int_a^b f(x) dx = I = \bar{I} = \underline{I}$$

יהי  $\varepsilon > 0$ , לפי דרבו אנו יודעים שקיים  $\delta > 0$  כך שלכל חלוקה  $T$  עם פרמטר  $\lambda(T) < \delta$  מתקיים  $\underline{S}(T) < I - \frac{\varepsilon}{2}$  וגם  $\bar{S}(T) < I + \frac{\varepsilon}{2}$  ולכן  $\bar{S}(T) - \underline{S}(T) < \varepsilon$ . זהו בדיוק התנאי השני. נעבור להוכחת הכיוון השני.

$\Rightarrow$ : נניח כי שני התנאים שכתבנו מתקיימים. לפי תנאי א'  $f(x)$  חסומה, ולכן  $\bar{I}, \underline{I}$  מוגדרים. לפי משפט, כדי להוכיח ש- $f(x)$  אינטגרבילית מספיק להוכיח כי  $\bar{I} = \underline{I}$ . לפי תנאי ב', מתקיים כי לכל  $\varepsilon > 0$  קיים  $\delta > 0$  כך שלכל חלוקה  $T$  שמקיימת  $\lambda(T) < \delta$  מתקיים  $\bar{S}(T) - \underline{S}(T) < \varepsilon$ . בנוסף ידוע כי לכל חלוקה  $T$  מתקיים  $\bar{S}(T) \geq \bar{I} \geq \underline{I} \geq \underline{S}(T)$ . מכאן ש- $\varepsilon > \bar{S}(T) - \underline{S}(T) < \bar{I} - \underline{I} \leq \bar{S}(T) - \underline{S}(T) < \varepsilon$ , לכן  $\bar{I} = \underline{I}$  ולכן  $f(x)$  אינטגרבילית. מ.ש.ל. ■

**משפט:** כאשר מעדנים את החלוקה, הסכום העליון אינו גדול.

$$\bar{S}(T') \leq \bar{S}(T)$$

**הוכחה:** ראשית, אם  $T = T'$  ברור שהסכומים העליונים שווים וסיימו.

נניח כי  $T' \neq T$ . מקבלים את החלוקה החדשה ע"י הוספת מספר סופי של נקודות. באינדוקציה, מספיק להוכיח את הטענה במקרה בו החלוקה החדשה מתקבלת מ- $T$  ע"י הוספת נקודה אחת.

לכן, בלי הגבלת הכלליות  $T'$  מתקבלת מ- $T$  ע"י זה שחילקנו את  $\Delta x_k$  לשניים (הוספנו נקודה  $C$  בין  $x_{k-1}$  ו- $x_k$ ).

$$\begin{aligned}
 M_i &= \sup\{f(x), x \in \Delta x_i\} & m_i &= \inf\{f(x), x \in \Delta x_i\} \\
 M'_k &= \sup\{f(x), x \in [x_{k-1}, C]\} & m'_k &= \inf\{f(x), x \in [x_{k-1}, C]\} \\
 M''_k &= \sup\{f(x), x \in [C, x_k]\} & m''_k &= \inf\{f(x), x \in [C, x_k]\}
 \end{aligned}$$

$$\bar{S}(T') = M_1 \Delta x_1 + \dots + M'_k (C - x_{k-1}) + M''_k (x_k - C) + M_n \Delta x_n \quad \text{ואז} \quad \bar{S}(T) = M_1 \Delta x_1 + \dots + M_n \Delta x_n$$

ולכן  $\bar{S}(T') - \bar{S}(T) \leq \underbrace{M'_k (C - x_{k-1}) + M''_k (x_k - C)}_{0 \leq} - M_k \Delta x_k \leq M_k (C - x_{k-1}) + M_k (x_k - C) - M_k \Delta x_k$

קיבלנו כי  $\bar{S}(T') - \bar{S}(T) \leq 0$ , ולכן  $\bar{S}(T') \leq \bar{S}(T)$  וז"א שהעדנה של חלוקה לא מגדילה את  $\bar{S}(T)$ . מ.ש.ל. ■

ה. משפט: מבחן האינטגרלי להתכנסות.

תהי פונקציה  $f(x)$  חיובית שהיא מונוטונית לא עולה בקטע  $[a, \infty)$  (ואז בפרט היא אינטגרבילית ב  $[a, b]$  ולכן ניתן לשאול לגבי ההתכנסות של  $\int_a^b f(x) dx$ . אזי  $\int_a^\infty f(x) dx$  מתכנס אם ורק אם הטור  $\sum_{n=0}^\infty f(a+n)$  מתכנס.

הוכחה:

$\Leftarrow$ : נגדיר שתי פונקציות מדרגות. לכל  $n \in \mathbb{N}$  נגדיר

$$g(x) = f(a+n): a+n \leq x < a+n+1$$

$$h(x) = f(a+n+1): a+n \leq x < a+n+1$$

מנוטונית  $f$ .

$$F(b) = \int_a^b f(x) dx$$

ולא עולה, לכן  $f(a+n+1) \leq f(x) \leq f(a+n)$  ולכן  $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ . נגדיר  $G(b) = \int_a^b g(x) dx$ . ידוע

$$H(b) = \int_a^b h(x) dx$$

כי  $f, g, h$  אי שליליות, ולכן  $F, G, H$  מונוטונית לא יורדות. לכן כל אחד מהאינטגרלים מתכנס כאשר הגבול העליון  $b$  שואף לאינסוף אם הפונקציה המתאימה חסומה.

לפי ההנחה  $\int_a^\infty f(x) dx$  מתכנס, ולכן לפי מבחן ההשוואה גם  $\int_a^\infty h(x) dx$  מתכנס ולכן  $H(b)$  חסומה מלעיל ולכן

$$H(a+n) = \int_a^{a+n} h(x) dx = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{a+i}^{a+i+1} h(x) dx = \text{אבל } \{H(a+n)\}_{n=0}^\infty \text{ חסומה מלעיל.}$$

$\sum_{i=1}^n f(a+i)$  לכן סדרת הסכי"ח של  $\sum_{i=0}^{n-1} \int_{a+i}^{a+i+1} f(a+i+1) dx = \sum_{i=0}^{n-1} f(a+i+1) = \sum_{i=1}^n f(a+i)$  חסומה ולכן הוא מתכנס. לכן גם הטור  $\sum_{n=0}^\infty f(a+n)$  מתכנס.

$\Rightarrow$ : נניח כי הטור  $\sum_{n=0}^\infty f(a+n)$  מתכנס. לכן סדרת הסכומים החלקיים שלו מתכנסת, ובפרט היא חסומה מלעיל. לכן, הסדרה  $\{\sum_{i=0}^{n-1} f(a+i)\}_{n=1}^\infty$  חסומה מלעיל.

נגדיר  $\int_{a+1}^{a+i+1} g(x) dx = f(a+i)$  ו  $\int_a^{a+k} g(x) dx = G(a+n)$ .  $\sum_{i=0}^{n-1} f(a+i) = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{a+i}^{a+i+1} g(x) dx = \int_a^{a+k} g(x) dx = G(a+n)$  לכן  $\{G(a+n)\}_{n=0}^\infty$  סדרה חסומה מליל. יהי  $M$  חסם עליון שלה.

לכל  $x$  ממשי קיים  $n$  טבעי כך ש  $x \leq a+n$ . לכן  $G(x) \leq G(a+n) \leq M$  לכן  $G(x)$  חסומה ולכן האינטגרל שלה

מתכנס. אבל לכל  $x$  ממשי ידוע שמתקיים  $0 \leq f(x) \leq g(x)$ . עי"פ המבחן ההשוואה, גם  $f(x)$  מתכנס. מ.ש.ל. ■

1. משפט: מבחן דיריכלה להתכנסות אינטגרלים לא אמיתיים מן הסוג הראשון

יהי  $a \in \mathbb{R}$  כך ש  $g(x)$  אינטגרבילית ב  $[a, b]$  לכל  $b > a$ . נניח כי קיים  $L$  ממשי כך ש  $|\int_a^b g(x) dx| \leq L$ . נניח גם כי  $f(x)$

יורדת וכי  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$  אז  $\int_a^b g(x)f(x) dx$  מתכנס.

הוכחה:

יהי  $\varepsilon > 0$ . כיוון שנתון כי  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$  קיים  $n_0$  כך שלכל  $x \geq n_0$  מתקיים  $|f(x)| < \frac{\varepsilon}{4L}$

מצד שני, לכל  $a < b_1 + b_2$  מתקיים:

$$\left| \int_{b_2}^{b_1} g(x) dx \right| = \left| \int_a^{b_2} g(x) dx - \int_a^{b_1} g(x) dx \right| \leq \left| \int_a^{b_2} g(x) dx \right| + \left| \int_a^{b_1} g(x) dx \right| \leq 2L$$

$$\left| \int_{b_2}^{b_1} g(x)f(x) dx \right| \stackrel{\text{עבור } b_1 \leq c \leq b_2}{\cong} \left| f(b_1) \int_{b_1}^c g(x) dx + f(b_2) \int_c^{b_2} g(x) dx \right|$$

לכן מתקיים

$$\leq |f(b_1)| \left| \int_{b_2}^{b_1} g(x) dx \right| + |f(b_1)| \left| \int_{b_2}^{b_1} g(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{4L} 2L + \frac{\varepsilon}{4L} 2L = \varepsilon$$

מתכנס. מ.ש.ל. ■

ז. משפט: מבחן M של ווירשטראס.

יהי  $\sum_{k=0}^{\infty} u_k(x)$  טור של פונקציות מוגדרות בקטע I. נניח שלכל  $k \geq 0$  קיים קבוע  $a_k \geq 0$  כך שלכל  $x \in I$  מתקיים  $|u_k(x)| \leq a_k$ . אם הטור  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$  (של מספרים) מתכנס, אזי הטור  $\sum_{k=0}^{\infty} u_k(x)$  מתכנס במידה שווה.

הוכחה: נבדוק את קריטריון קושי עבור הטור של הפונקציות. יהי  $\varepsilon > 0$ , ע"פ קריטריון קושי עבור טורי מספרים קיין

N כל שכל  $n \geq N$  ולכל  $p \geq 0$  מתקיים  $\sum_{k=n}^{n+p} a_k < \varepsilon$ . בפרט, לכל  $x_0 \in I$  ולכל  $n \geq N$  ולכל  $p \geq 0$  מתקיים כי

$$\sum_{k=0}^{\infty} u_k(x) \text{ מתכנס במ"ש לפי קריטריון קושי עבור } \left| \sum_{k=n}^{n+p} u_k(x) \right| \leq \sum_{k=n}^{n+p} |u_k(x)| \leq \sum_{k=n}^{n+p} a_k < \varepsilon$$

טורי פונקציות. מ.ש.ל. ■

ח. משפט: אם סדרת פונקציות מתכנסת במידה שווה בקטע סגור, אזי האינטגרלים שלהם שואפים לאינטגרל של הפונקציה הגבולית.

תהי  $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$  סדרה של פונקציות אינטגרביליות בקטע  $[a, b]$ .

נזכור שניתן להגדיר פונקציות כך  $F_n(x) = \int_a^x f_n(t) dt$ . נניח שהסדרה  $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$  מתכנסת במ"ש לפונקציה גבולית  $f(x)$  אזי:

1. הסדרה  $\{F_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$  מתכנסת במ"ש לפונקציה גבולית  $F(x)$ .

2. הפונקציה הגבולית  $f(x)$  אינטגרבילית בקטע  $[a, b]$ .

$$3. F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

הוכחה:

2. יהי  $\varepsilon > 0$ . לפי ההנחה קיים n מספיק גדול כך שמתקיים  $\forall x \in [a, b] : |f(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{4(b-a)}$

בפרט, לכל  $y', y'' \in [a, b]$  מתקיים

$$|f(y') - f(y'') - f_n(y') + f_n(y'')| \leq |f_n(y') - f(y')| + |f_n(y'') - f(y'')| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$$

שלנו הפונקציה  $f_n(x)$  אינטגרבילית בקטע  $[a, b]$ . לכן היא חסומה בקטע וקיים  $\delta > 0$  כך שלכל חלוקה T של

הקטע עם  $\lambda(T) < \delta$  מתקיים  $\sum_{i=1}^n \omega_{f_n, i} \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2}$ . ו  $\omega_{f_n, i} = \sup\{f_n(x) : x \in \Delta x_i\} - \inf\{f_n(x) : x \in \Delta x_i\}$

לפי אי שוויון המשולש  $\forall x \in [a, b] : |f(x)| \leq |f_n(x)| + \frac{\varepsilon}{4(b-a)}$  ולכן חסומה

$$|f(y') - f(y'')| \leq |f_n(y') - f_n(y'')| + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$$

ונגדיר  $\omega_{f, i} = \sup\{f(y') - f(y'') : y', y'' \in \Delta x_i\} \leq \omega_{f_n, i} + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$  כיוון שזהו חסם מלעיל עבור

$\{f(y') - f(y'') : y', y'' \in \Delta x_i\}$  אזי לכל חלוקה T של  $[a, b]$  עם  $\lambda(T) < \delta$  מתקיים :

$$\sum_{i=1}^n \omega_{f, i} \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n \left( \omega_{f_n, i} + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \right) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \omega_{f_n, i} \Delta x_i + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \sum_{i=1}^n \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} (b-a) = \varepsilon$$

לפי הקריטריון של רימן  $f(x)$  אינטגרבילית בקטע  $[a, b]$ .

1.31. יהי  $\varepsilon > 0$  נתון. לפי ההנחה של התכנסות במ"ש קיים  $n$  כך שלכל  $n \geq N$  ולכל  $t \in [a, b]$  מתקיים  $|f(t) - f_n(t)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$ . נגדיר כעת פונקציה  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ . לפי סעיף ב' שהוכחנו הפונקציה  $F(x)$  אגן מוגדרת. צריך להוכיח שהסדרה  $\{F_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$  מתכנסת במ"ש לגבול  $F(x)$ . לכל  $n \geq N$  ולכל  $x \in [a, b]$  מתקיים  $|F(x) - F_n(x)| = \left| \int_a^x (f(t) - f_n(t)) dt \right| \leq \int_a^x |f(t) - f_n(t)| dt < \int_a^x \frac{\varepsilon}{b-a} dt = \varepsilon$   
 הסדרה  $\{F_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$  מתכנסת במ"ש לפונקציה הגבולית  $F(x)$ . מ.ש.ל. ■

ט. **משפט:** אם סדרה של פונקציות רציפות שמתכנסת במ"ש אזי הפונקציה הגבולית גם רציפה.

נניח כי כל הפונקציות  $f_n(x)$  רציפות בקטע  $I$ . ונניח כי הסדרה  $\{f_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$  מתכנסת במ"ש. וצריך להוכיח כי הפונקציה הגבולית  $f(x)$  גם כן רציפה ב- $I$ .

**הוכחה:** יהי  $\varepsilon > 0$ . רוצים להוכיח שלכל  $x_0 \in I$  קיים  $\delta > 0$  כך שלכל  $x \in I$  כך ש- $|x - x_0| < \delta$  מתקיים  $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ . כיוון שהסדרה  $\{f_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$  מתכנסת במ"ש, קיים  $N$  כך שלכל  $n \geq N$  ולכל  $x \in I$  מתקיים  $|f(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$ .

נקבע איזשהו  $n \geq N$  יהי  $x_0 \in I$ . לפי ההנחה רציפה, ולכן קיים  $\delta > 0$  כך שלכל  $|x - x_0| < \delta$  מתקיים  $|f_n(x) - f_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$ .

וכעת יהי  $x \in I$  נקודה כך ש- $|x - x_0| < \varepsilon$  אזי:

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &= |f(x) - f_n(x) + f_n(x) - f_n(x_0) + f_n(x_0) - f(x_0)| \\ &\leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| = 3 \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

ולכן  $f(x)$  רציפה בנקודה  $x_0$  לכל  $x_0 \in I$  ולכן  $f(x)$  רציפה בכל  $I$ . מ.ש.ל. ■

י. **משפט:** קיום וחישוב של רדיוס ההתכנסות של טור חזקות.

יהי  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$  טור חזקות כלשהו ונגדיר  $R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$  (רדיוס ההתכנסות). אזי:

1. אם  $|x - x_0| < R$  מתקיים, הטור מתכנס בהחלט.
2. אם  $|x - x_0| > R$  מתקיים, הטור מתבדר.
3. אם  $0 < r < R$  אז הטור מתכנס במ"ש בקטע  $[x_0 - r, x_0 + r]$ .

**הוכחה:**

1. יהי  $x$  כך ש- $|x - x_0| < R$ . נבחר  $P < R$  כך ש- $|x - x_0| < P < R$  ומכאן  $\frac{1}{R} < \frac{1}{P}$  וע"פ הגדרה

קיים  $n_0$  כך שלכל  $n \geq n_0$  מתקיים כי  $\frac{|x - x_0|}{P} < 1$  ולכן  $\sqrt[n]{|a_n|} |x - x_0| < \frac{|x - x_0|}{P} < 1$

מכאן שמדובר בכך ש- $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{|x - x_0|}{P}\right)^n$  טור הנדסי שמתכנס, וע"פ מבחן ההשוואה גם  $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| |x - x_0|^n$

מתכנס. ז"א, הטור המקורי מתכנס בהחלט בנקודה  $x$ .

2. כעת נבחר  $|x - x_0| = P$ . לפי נתון  $\frac{1}{R} > \frac{1}{P}$  ולכן יש אינסוף אינדקסים כך

ש  $\sqrt[n]{|a_n|} |x - x_0| > \frac{|x - x_0|}{P} > 1$  ואז ברור כי  $|a_n| |x - x_0|^n > 1$  ולכן  $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| |x - x_0|^n$  מתבדר (האיבר הכללי לא שואף לאפס)

3. נבחר  $P$  כך ש  $0 < r < P < R$  כמו בסעיף 1, קיים  $n_0$  כך שלכל  $n \geq n_0$  מתקיים  $\sqrt[n]{|a_n|} < \frac{1}{P}$  ועבור  $|x - x_0| \leq r$

מתקיים כי  $|a_n| |x - x_0|^n < \left(\frac{r}{P}\right)^n$  ומצאנו חסם לכל איבר  $n$  בטור  $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| |x - x_0|^n$ . בגלל שסכום החסמים

$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r}{P}\right)^n$  הוא טור הנדסי מתכנס נקבל ממבחן  $M$  של ווירשטראס ש  $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| |x - x_0|^n$  מתכנס במ"ש

בקטע  $[x_0 - r, x_0 + r]$ .

■ מ.ש.ל.

יא. **משפט**: כל טור חזקות בעל רדיוס התכנסות חיובי הינו טור טיילור של הסכום שלו.

**הוכחה**: ראשית ידוע כי הטור הוא חזקות ולכן נראה כך:  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ . ע"י גזירה איבר איבר (וזה מותר כי יש לו רדיוס התכנסות חיובי, ואז אפשר לגזור על אותן נקודות שברדיוס ההתכנסות שלו) ניתן לפתח נוסחה

לנגזרת האית, שנתונה ע"י  $f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n!}{(n-k)!} a_n (x - x_0)^{n-k}$ . כעת, נבחר  $x = x_0$  ונקבל שכל האיברים

מתאפסים פרט למקרה בו  $n=k$ . ז"א  $f^{(k)}(x_0) = k! a_k$  ואז  $a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$ . וקיבלנו את הדרוש. מ.ש.ל. ■

לגבי ההוכחה למשפט 11 אין אני כל כך בטוח.

יכול להיות שגם צריך להוכיח כי הנגזרת אכן ניתנת להצגה כך.

**בהצלחה לכולנו !!!**