

88132) חשבון אינפיניטסימלי 1 | מבחן תשע"ז מועד ב'

הצעת פתרון | לירן מנצורי ויונתן סמידוברסקי

שאלה 1

יהיו $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות מתכנסות של מספרים ממשיים. יהיו $a := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ו $b := \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

הוכח: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot b_n = ab$.

הוכחה יהי $\epsilon < 0$, מהנתון קיימים

$$N_1 \text{ כך שלכל } n \geq N_1 \text{ מתקיים } |a_n - a| \leq \epsilon$$

$$N_2 \text{ כך שלכל } n \geq N_2 \text{ מתקיים } |b_n - b| \leq \epsilon$$

כעת ניקח $N := \max\{N_1, N_2\}$ ולכל $n \geq N$ מתקיימים שני התנאים, כעת

$$|a_n b_n - ab| = |a_n b_n - ab_n + ab_n - ab|$$

כעת מאי-שיוויון המשולש

$$\leq |a_n b_n - ab_n| + |ab_n - ab| = |b_n(a_n - a)| + |a(b_n - b)|$$

כעת b_n מתכנסת ובפרט חסומה, $b_n \leq c$ עבור c כלשהו.

$$= |b_n| \cdot |a_n - a| + |a| \cdot |b_n - b| \leq c\epsilon + |a|\epsilon = (c + |a|)\epsilon$$

ולכן סיימנו.

שאלה 2

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סידרה המקיימת $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot a_{n+1} = 1$.

הוכח שלכל גבול חלקי $a \neq 0$ של הסידרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, גם המספר $\frac{1}{a}$ הוא גבול חלקי שלה.

תהי a_{m_n} תת-סדרה של a_n כך ש $a_{m_n} \rightarrow a \neq 0$.

נראה כי $a_{m_{n+1}} \rightarrow \frac{1}{a}$.

מתקיים כי החל משלב מסויים $a_n \neq 0$ (אחרת יש סתירה לגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n a_{n+1} = 1$) ומשום ש a_{m_n} מתכנס וכן $a_{m_n} \cdot a_{m_{n+1}}$ וכן $a_{m_n} \neq 0$ החל בשלב מסויים, אפשר להסתכל על מנת הגבולות.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{m_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{m_n} \cdot a_{m_{n+1}}}{a_{m_n}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{m_n} \cdot a_{m_{n+1}})}{\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{m_n})} = \frac{1}{a}$$

ולכן סיימנו.

שאלה 3

לכל אחד מהטורים הבאים, בדוק האם הוא מתכנס בהחלט, מתכנס בתנאי, או מתבדר.

א. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\arctan n}{n}$

ב. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{\cos n}{n^2}$

ג. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\binom{2n}{n}}$

סעיף א

תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה בכל הישר הממשי ונניח שהיא חד-חד ערכית.

מציפות, מספיק להוכיח שלא קיים מינימום או מקסימום ל- f

נניח בשלילה כי קיים לה מקסימום, בנק' $M \in \mathbb{R}$. אם f קבועה לכל $x < M$ או $x > M$, מקבלים סתירה ל"חד-חד".

לכן יש $b < M, c > M$ כך ש- $f(b) < f(M) < f(c)$ וכן $f(c) < f(M) < f(b)$. מסתכלים על הקטע $[b, c]$ ולפי ערך הביניים,

הפונקציה f מקבלת כל ערך $f(b) < d < f(c)$. כעת לכל $x > M$ מתקיים:

$f(x) = M$ - יכול לקרות לתחום מסויים, משום שהיא לא קבועה, ניקח x מספיק גדול כך ש- $f(x) \neq M$

$f(x) > M$ - סתירה להיותה מקסימום

$f(x) < M$ - סתירה לחד-חד ערכיות

הראינו שלא קיים מקסימום ל- f ,

כעת נפעיל את המשפט על $-f(x)$, לא קיים ל- $-f$ מקסימום.

כלומר לא קיים $b < x < c$ כך שלכל $b < x' < c$ השונה מ- x , $x \neq x'$, מתקיים $-f(x') < -f(x)$

כלומר $f(x') > f(x)$, וזוהי הגדרת המינימום ולכן סיימו.

סעיף ב

קל להראות שמתכנס בהחלט ממבחן ההשוואה

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n \cos(n)}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos(n)|}{n^2} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$$

מתכנס בהחלט

סעיף ג

נסה התכנסות בהחלט

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{\binom{2n}{n}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(2n-n)!}{(2n)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!^2}{(2n)!}$$

$$\begin{aligned}\frac{(n+1)!^2}{(2(n+1))!} \cdot \frac{(2n)!}{n!^2} &= \left(\frac{(n+1)!}{n!}\right)^2 \cdot \frac{2n!}{(2n+2)!} = (n+1)^2 \cdot \frac{1}{(2n+1) \cdot (2n+2)} \\ &= \frac{(n+1)}{2(2n+1)} = \frac{n+1}{4n+2} \rightarrow \frac{1}{4} < 1\end{aligned}$$

וסיימנו, מתכנס בהחלט

שאלה 4

הוכח שלפונקציה $\cos(\sqrt{\ln 1/|x|})$ אין גבול בנקודה $x = 0$.

נשתמש בלשון היינה. בעזרת הנדוס לאחר, אפשר למצוא שתי סדרות $a_n \rightarrow 0, b_n \rightarrow 0$ כך ש $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n)$ ניקח

$$a_n := \frac{1}{e^{(\pi+2\pi n)^2}}$$

$$b_n := \frac{1}{e^{(\frac{\pi}{2}+2\pi n)^2}}$$

ומתקיים כי

$$f(a_n) = \cos(\sqrt{\ln(e^{(\pi+2\pi n)^2})}) = \cos(\pi + 2\pi n) = -1 \rightarrow -1$$

$$f(b_n) = \cos(\sqrt{\ln(e^{(\frac{\pi}{2}+2\pi n)^2})}) = \cos(\frac{\pi}{2} + \pi n) = 0 \rightarrow 0$$

שאלה 5

תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה בכל הישר הממשי \mathbb{R} . הוכח:

א. אם הפונקציה f חד-חד ערכית, אז היא מונוטונית (עולה או יורדת).

ב. היעזר בסעיף הקודם להוכיח שקיים מספר ממשי x כך ש $f(f(x)) \neq -x$.

סעיף א

תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה בכל הישר הממשי ונניח שהיא חד-חד ערכית.

מרציפות, מספיק להוכיח שלא קיים מינימום או מקסימום ל f

נניח בשלילה כי קיים לה מקסימום, בנק' $M \in \mathbb{R}$. אם f קבועה לכל $x < M$ או $x > M$, מקבלים סתירה לחח"ע.

לכן יש $b < M, c > M$ כך ש $f(b) < f(M)$ וכן $f(c) < f(M)$. מסתכלים על הקטע $[b, c]$ ולפי ערך הביניים,

הפונקציה f מקבלת כל ערך $f(b) < d < f(c)$. כעת לכל $x > M$ מתקיים:

$f(x) = M$ - יכול לקרות לתחום מסויים, משום שהיא לא קבועה, ניקח x מספיק גדול כך ש $f(x) \neq M$

$f(x) > M$ - סתירה להיותה מקסימום

$f(x) < M$ - סתירה לחד-חד ערכיות

הראינו שלא קיים מקסימום ל- f ,

כעת נפעיל את המשפט על $-f(x)$, לא קיים ל- $-f$ מקסימום.

כלומר לא קיים $b < x < c$ כך שלכל $b < x' < c$ השונה מ- x , מתקיים $-f(x') < -f(x)$

כלומר $f(x') > f(x)$, וזוהי הגדרת המינימום ולכן סיימנו.

סעיף ב

נניח בשלילה שלכל x מתקיים $f(f(x)) = -x$

$-x$ היא חח"ע, כלומר $f \circ f$, אבל ממשפט גם f חח"ע

ולפי מה שהראינו מונוטונית.

נניח מונוטונית עולה,

ניקח $x_1 \leq x_2$ ומתקיים $f(x_1) \leq f(x_2)$, כעת אם נפעיל את f שהיא פונקציה עולה על שני הערכים נקבל

$$f(f(x_1)) \leq f(f(x_2))$$

כלומר

$$-x_1 \leq -x_2$$

ובדומה, אם נניח שהיא מונוטונית יורדת.

וזו סתירה לכלליות x_1, x_2 - זה מתקיים רק ל $x_1, x_2 = 0$.